



Les oiseaux de la baie de Seine occidentale



L'OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE (OFB)

L'OFB est un **établissement public** dédié à la **sauvegarde de la biodiversité** en métropole et dans les Outre-mer. Fondé le 1er janvier 2020, il agit pour la **protection** et la **restauration** du vivant dans les milieux aquatiques, terrestres et marins.

Ces actions sont réalisées en mobilisant un ensemble d'acteurs, de décideurs et de citoyens afin de lutter contre l'érosion de la biodiversité.

LE SITE NATURA 2000 BAIE DE SEINE OCCIDENTALE

Le réseau Natura 2000 a pour but de contribuer à la **préservation de la biodiversité** sur le territoire et de maintenir ou d'atteindre un **état de conservation favorable** des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire de la faune et de la flore.

Le site Natura 2000 « Baie de Seine occidentale » a été désigné au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore pour être une Zone spéciale de conservation (**ZSC**) et au titre de la Directive Oiseaux pour être une Zone de Protection Spéciale (**ZPS**), qui s'étend de la pointe de Saire à Vierville-sur-mer jusqu'à 12 milles marins des côtes (20 km).

La présence de 34 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire a entraîné cette désignation ZPS, qui est également **d'importance nationale** pour 10 oiseaux comme par exemple : le cormoran huppé (*Gulosus aristotelis*), la mouette mélanocéphale (*Ichthyaetus melanocephalus*) et le plongeon arctique (*Gavia arctica*).

Nous avons choisi de vous présenter ici 15 espèces qui sont les plus régulièrement présentes sur le site. Ces espèces sont présentées adultes en période de reproduction.

Zone de protection spéciale Baie de Seine occidentale



Légende

-  ZPS Baie de Seine occidentale
-  ZPS à proximité

EDITEE LE : 19 / 11 / 2024

Sources des données :
Périmètre AMP : BD AMP AAMP 2018
Fonds cartographiques : Plan IGN
Système de coordonnées : EPSG:2154

GENERALITES SUR LES OISEAUX MARINS

Les oiseaux marins appartiennent à plusieurs familles. Leur alimentation étant principalement ou partiellement issue de la mer, on les retrouve à proximité de celle-ci (falaises, plages, etc.), jusqu'au large.

Certains comme les goélands s'aventurent en ville pour s'y nourrir et s'y reproduire.

LES OBSERVER SANS LES DERANGER

Les oiseaux marins, comme tous les autres animaux, sont impactés par les **dérangements répétés**. En période de reproduction, cela peut conduire à une **diminution du succès reproducteur** dû à l'abandon des nids et à l'**augmentation de la prédation** des couvées. En période d'hivernage ou de migration, cela peut conduire à un **affaiblissement de l'individu** : diminution des ressources énergétiques due au stress, accès limité aux sites d'alimentation et abandon des habitats.

Signes de dérangement

Envol, Simulation d'attaque, Simulation d'oiseau blessé, Cri et Arrêt de l'activité en cours




Attitudes à adopter

A pied :

- Ne pas s'approcher des oiseaux en groupe sur la plage, tenir son chien en laisse
- S'éloigner rapidement lors de signes de dérangement
- Eviter les bruits forts (éclats de voix, sifflements, aboiement)
- Eviter tout geste brusque

En bateau :

- Ne pas s'approcher des oiseaux en groupe sur l'eau (radeau)
- Eviter tout changement brutal de vitesse ou de direction



Mouette tridactyle

Famille : Laridae
Plumage nuptial

Rissa tridactyla

Ailes grises

Pointes
noires

Tête blanche

Bec jaune

Pattes
noires

Dessous du corps
blanc



Longueur : 37 - 42 cm

Envergure : 93 - 105 cm

Poids : 300 - 450 g

Longévité : environ 20 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présente toute l'année sur la ZPS :
nicheuse sur les falaises du Bessin,
elle vient s'alimenter sur le site



Nidification


Avril à fin juillet

Ponte de 3 œufs, nid sur corniche
à base d'herbes, d'algues et de
terre



Alimentation

Petits poissons, céphalopodes,
organismes planctoniques



Mouette mélanocéphale

Famille : Laridae
Plumage nuptial

Ichthyæetus melanocephalus

Capuchon
noir
descendant
vers la nuque

Bec épais
rouge vif

Pattes
rouges

Pointes blanches

Dessous
du corps
blanc



Longueur : 37 - 40 cm

Envergure : 94 - 102 cm

Poids : 220 - 380 g

Longévité : environ 20 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Halte migratoire et hivernante sur le site



Nidification


Mai à fin juillet

Ponte de 2 à 3 œufs, nid au sol à base de végétaux, près des étangs, marais, lacs...



Alimentation


Petits poissons, mollusques, insectes aquatiques et terrestres, végétaux...



Fulmar boréal

Famille : Procellariidae

Fulmarus glacialis



Longueur : 43 - 52 cm



Envergure : 101 - 117 cm



Poids : 700 - 900 g



Longévité : environ 30 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent de mi-novembre à mi-septembre sur la ZPS : nicheur sur les falaises du Bessin, il s'alimente sur le site



Nidification


Février à août

Ponte d'un seul œuf à même le sol, en falaise littorale



Alimentation


Petits organismes marins qu'il pêche à la surface



Goéland marin

Larus marinus

Famille : Laridae
Plumage nuptial



 **Longueur** : 61 - 74 cm
 **Envergure** : 144 - 166 cm
 **Poids** : 1500 - 2000 g
 **Longévité** : environ 20 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent toute l'année sur la ZPS :
nicheur et hivernant sur le site
(Iles Saint-Marcouf et Tatihou)




Nidification

Avril à fin août
Ponte de 3 œufs, nid à base de
végétaux



Alimentation


Poissons, petits mammifères,
œufs et oiseaux, rejets de pêche
et végétaux



Goéland brun

Famille : Laridae
Plumage nuptial

Larus fuscus



 **Longueur** : 48 - 56 cm
 **Envergure** : 117 - 134 cm
 **Poids** : 650 - 1000 g
 **Longévité** : environ 25 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent toute l'année sur la ZPS :
nicheur et hivernant sur le site
(Iles Saint-Marcouf et Tatihou)




Nidification

Avril à fin août
Ponte de 3 œufs dans un nid à
base de végétaux



Alimentation


Poissons, poussins, mollusques,
invertébrés, déchets, végétaux



Goéland argenté

Famille : Laridae
Plumage nuptial

Larus argentarius



Longueur : 54 - 70 cm
Envergure : 113 - 148 cm
Poids : 750 - 1300 g
Longévité : environ 30 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent toute l'année sur la ZPS :
nicheur et hivernant sur le site
(Iles Saint-Marcouf et Tatihou)




Nidification

Mars à août
Ponte de 3 œufs dans un nid à
base de végétaux



Alimentation

Poissons, mollusques, crustacés,
petits mammifères, végétaux, ...




Cormoran huppé

Famille : Phalacrocoracidae

Plumage nuptial

Gulosus aristotelis



Longueur : 68 - 78 cm

Envergure : 95 - 110 cm

Poids : 1750 - 2250 g

Longévité : environ 15 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent toute l'année sur la ZPS :
nicheur et hivernant sur le site
(Iles Saint-Marcouf et Tatihou)



Nidification


février à fin août

Ponte de 1 à 6 œufs dans un nid
à base d'algues, de branchages
et de déchets marins



Alimentation

Poissons dans les eaux peu
profondes



Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

Famille : Phalacrocoracidae

Plumage nuptial

Tête noire,
parsemée de
plumes blanches

Plumage
noir avec
des
reflets
bleu-vert

Bec épais, long et
crochu

Poche jugulaire jaune,
zone blanche à la base
du bec

Tâche blanche sur la
cuisse

Pattes noires et
palmées

 **Longueur :** 77 - 94 cm
Envergure : 121 - 149 cm
Poids : 2000 - 3500 g
Longévité : environ 20 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent toute l'année sur la ZPS :
nicheur et hivernant sur le site
(Iles Saint-Marcouf)




Nidification

Février à fin août
Ponte de 3 à 6 œufs dans un nid
à base d'algues, de branchages
et de déchets marins



Alimentation


Poissons, poussins, mollusques,
invertébrés, déchets, végétaux



Plongeon catmarin

Gavia stellata

Famille : Gaviidae
Plumage interuptial



Longueur : 55 - 67 cm

Envergure : 91 - 110 cm

Poids : 1100 - 1900 g

Longévité : environ 27 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent de mi-octobre à fin mars
sur la ZPS : hivernant sur le site




Nidification

Ponte de 2 à 3 œufs dans un nid grossier à base d'amas de végétaux (principalement le Groenland, l'Islande et Scandinavie)



Alimentation


Poissons, occasionnellement crustacés et petits insectes



Plongeon arctique

Gavia arctica

Famille : Gaviidae
Plumage internuptial



Longueur : 63 - 75 cm

Envergure : 100 - 122 cm

Poids : 1300 - 3400 g

Longévité : environ 20 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent de mi-octobre à fin mars
sur la ZPS : hivernant sur le site




Nidification

Ponte de 2 à 3 œufs dans un nid
grossier à base d'amas de
végétaux (principalement en
Scandinavie, Finlande et Russie)



Alimentation

Poissons, occasionnellement
crustacés et petits insectes



Pingouin torda

Alca torda

Famille : Alcidae
Plumage interuptial

Bec massif et comprimé, sombre barré d'un trait blanc

Ventre blanc
Aisselles blanches


Pattes palmées gris clair

Dessus de la tête noir, trait blanc fin allant du bec à l'oeil

Dos noir



Longueur : 38 - 43 cm
Envergure : 60 - 69 cm
Poids : 625 - 750 g
Longévité : environ 20 ans



BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent de mi-septembre à fin mars sur la ZPS : hivernant sur le site



Nidification

Ponte d'un œuf unique sur la roche




Alimentation

Poissons, crustacés, vers et mollusques

Guillemot de Troil

Uria aalge

Famille : Alcidae
Plumage internuptial



Longueur : 38 - 46 cm
Envergure : 61 - 73 cm
Poids : 500 - 1000 g
Longévité : environ 15 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent de mi-septembre à fin mars sur la ZPS : hivernant sur le site




Nidification

Ponte d'un œuf unique sur la roche



Alimentation

Poissons, crustacés et petits calamars




Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Famille : Podicipedidae

Plumage internuptial



Longueur : 46 - 51 cm

Envergure : 59 - 73 cm

Poids : 700 - 1200 g

Longévité : environ 10 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent de mi-octobre à mars sur la ZPS : hivernant sur le site



Nidification


Janvier à Septembre

Ponte de 3 à 6 œufs dans un nid à base de végétaux



Alimentation


Poissons, larves, crustacés, insectes, mollusques et parfois végétaux



Fou de Bassan

Famille : Sulidae

Morus bassanus



Longueur : 85 - 97 cm

Envergure : 170 - 192 cm

Poids : 2800 - 3200 g

Longévité : environ 20 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent toute l'année sur la ZPS :
estivant et hivernant sur le site



Nidification


Janvier à septembre

Ponte d'un œuf unique dans un nid à
base de branches, déchets marins,...
(colonies proches : Aurigny, les Sept-
Îles)



Alimentation

Poissons saisis jusqu'à 25m de
profondeur en piqué après un vol
pouvant aller jusqu'à 40m de haut




Macreuse noire

Melanitta nigra

Famille : anatidae

Mâle en plumage nuptial



Longueur : 44 - 54 cm

Envergure : 70 - 84 cm

Poids : 900 - 1300 g

Longévité : environ 17 ans

BIOLOGIE ET ECOLOGIE

Présent de mi-octobre à fin mars
sur la ZPS : hivernante sur le site




Nidification

De mai à juin, nid posé sur le sol, à proximité de l'eau, 8 œufs près des lacs de tourbières, forêt nordiques, toundra.



Alimentation

Coquillages, mollusques, crustacés et vers marins



Signification des légendes et des symboles



Longueur : de la pointe du bec au bout de la queue, chez l'adulte

Envergure : distance entre l'extrémité des ailes lorsqu'elles sont déployées

Statuts de conservation :

Listes rouges de

Cat. Intitulé de la catégorie

EX	Espèce éteinte au niveau mondial	
EW	Espèce éteinte à l'état sauvage	Espèces disparues
RE	Espèce disparue au niveau régional	
CR	Espèce en danger critique	
EN	Espèce en danger	Espèces menacées
VU	Espèce vulnérable	
NT	Espèce quasi menacée	Espèces à surveiller
LC	Espèce de préoccupation mineure	Espèces non menacées
DD	Espèce dont les données sont déficientes	

Catégories des menaces selon l'UICN.

M : LR Mondiale
2021

E : LR Europe
2021

F : LR France
Nicheurs 2016



Hivernants 2011



N : LR
Normandie
Nicheurs 2024



NAb

Espèce occasionnelle

NAC

Espèce régulièrement présente en métropole en hivernage mais ne remplissant pas les critères d'une présence significative

OISEAUX EN DETRESSE ?

On vous explique les premiers gestes !

1 Analyser la situation

Avant toute intervention, assurez vous que l'individu est réellement en détresse (marques de blessures, attitude inhabituelle...). Afin d'éviter toute erreur, renseignez-vous auprès d'un centre de soin pour d'éventuels conseils.



2 Conditionner l'animal

Utilisez des **gants** pour **protéger vos mains** (la puissance du bec chez certains oiseaux peut être gênante) et n'oubliez pas de protéger vos yeux. Utilisez un **linge pour le recouvrir** afin de limiter tout stress chez l'animal. Placez le dans un **carton adapté à sa taille**, puis placez une bouillotte entourée d'un linge afin d'éviter l'hypothermie.



3 Evitez les mauvais réflexes

Ne donner ni à manger ni à boire à l'animal sans un avis d'un professionnel. Un mauvais aliment ou un mauvais dosage de nourriture peut être fatal à l'individu.



4 Confier l'animal à des professionnels

Contactez au plus vite le centre de soin le plus proche pour une prise en charge de l'animal. Dans la région de la baie de Seine occidentale, le centre de soin le plus proche est le CHENE (02 35 96 06 54).

Attention : le centre ne se déplace pas, c'est à vous de ramener l'oiseau en détresse. Vous avez l'obligation légale de prévenir le centre avant tout transport d'un animal sauvage.

Rédaction et conception :

Léa Mathieu-Daudé, Marine Grenier, Sophie Poncet – OFB

Illustrations : Camille Dégardin, Xavier Tomezak